

Envicoc Forte er et desinfektionsmiddel specielt udviklet til, udover bakterier, vira og svampe, bl.a. også at bekæmpe coccidier, ormeæg og cryptosporidier. **Envicoc Forte** egner sig til overfladedesinfektion indenfor intensivt dyrehold, så som svinestalde, kvægstalde og kalvehytter, fjerkræshuse m.m.

- Viker effektivt mod bl.a. coccidier, ormeæg og kryptosporidier
- Virker i dybden
- Lav dosering

Envicoc Forte må kun anvendes i tomme stalde. Før brug skal alle overflader være rengjorte og der skal være anvendt en alkalisk sæbe, der efterfølgende nedvaskes. Egner sig ikke til tågedesinfektion.

Dosering:	Anvendelsesområde	Brugsopløsning	Indvirkningstid
	Coccidier, orm (æg og larver)	2,00% (ved 18-22 grader)	120 min.
	Vira	2,00%	60 min.
	Mykobakterier	1,00%	60 min.
	Bakterier og gærarter	0,75%	30 min.

Det anbefales at der udluftes i mindst 12 timer før indsættelse af dyr. Indvirkningstiden bør forlænges ved lavere temperaturer.

Typiske problemer med coccidiose

Coccidiose er en parasitær tarmlidelse forårsaget af små encellede parasitter - coccidier - der findes overalt i staldmiljøet og også på græsningsarealer. Sygdommen kan give diarré og gøre omfattende skade på dyrets tarmslimhinde. Coccidiose er en meget tabsvoldende produktionssygdom. Dyr, der har været inficerede med coccidiose vil have en nedsat tilvækst, være mere modtagelige overfor andre infektioner, og i nogle tilfælde kan sygdommen være dødelig. Det er væsentligt bedre at forebygge coccidiose end at behandle sygdommen, da der allerede er sket alvorlige skader på dyrets tarm, når der ses tegn på sygdom.

Læs altid sikkerhedsdatablad og brugsanvisning på emballagen før brug.

Emballage: 10,7 kg / 10 Liter

